

## پیپاٹائش سی کیا ہے؟

پیپاٹائش سی جگر کے انفیکشن کی تین اقسام میں سے ایک ہے (باقی دوائے اور بی ہیں) یہ واحد قسم ہے جس کی ابھی تک کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ کیوبک میں اس بیماری کے مریضوں کو اس مرض کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ پیپاٹائش سی کا وائزس 5 سے 7 ہفتے تک جسم سے باہر زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہے۔

## پیپاٹائش سی کا پھیلاو:

ساری دنیا میں تقریباً 71 ملین افراد پیپاٹائش سی کے مستقل کیریئر ہیں اور زیادہ تر افراد اس سے ناواقف ہیں۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی علامات خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی جگر مکمل بے کار ہو چکا ہوتا ہے۔

کچھ خاص ممالک میں پیپاٹائش سی کے کیریئر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

✓ الجیریا
✓ بنگلہ دیش
✓ چائے
✓ مصر
✓ یونان
✓ اٹلی
✓ پاکستان
✓ صومالیہ
✓ ویتنام
✓ فلپائن

ان ممالک میں یا تو پیپاٹائش سی کے پھیلاو کی شرح زیادہ ہے، یا ان کی آبادی کا بڑا حصہ پیپاٹائش سی کے ساتھ زندہ ہے۔

اس لئے، اگر آپ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں یہ بیماری لگنے کی شرح زیادہ ہے، یہ آپ کیلئے بہتر ہو گا کہ آپ ایک سکرین ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ اس کی بیماری سے بچ سکیں اور غیر ارادی طور پر دوسروں میں منتقل نہ ہو۔

کینڈا میں تقریباً ڈھائی لاکھ افراد پیپاٹائش سی کا شکار ہیں اور ان میں زیادہ تر عالم ہیں کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔

## ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم ایک فیبلی ڈاکٹر نہیں رکھتے؟

پیپاٹائش سی کا مفت اور رازدار انہ ٹیسٹ حاصل کرنے کے لئے آپ کال کر سکتے ہیں۔ 514-934-0505، ایکسٹینشن 7406

## پیپاٹائٹس سی کا وائرس کیسے منتقل ہوتا ہے؟

میڈیکل اور ڈینٹل علاج کے لئے جو آلات استعمال ہوتے ہیں انہیں مناسب طور پر سٹر لا یز نہیں کیا جاتا۔ خاص طور پر اُن ممالک میں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

☆ پیپاٹائٹس سی کے مریض کے خون سے۔

☆ پہلے سے استعمال شدہ ہائپوڈر مک سوئیاں یا ایسی چیزیں جو جلد کے اندر پیوست ہو سکیں۔

☆ اکثر اوقات ڈیلیوری کے دوران میں سے بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔

## اس کی دو حالاتیں ہیں:

☆ ایک شدید حالت جو کہ بیماری لگنے سے 6 ماہ تک رہتی ہے۔ اس حالت کے دوران ایسے شخص میں اگر یہ علامات نمایاں نہیں ہوتی پھر بھی وہ شخص یہ وائرس دوسروں میں منتقل کر سکتا ہے۔

☆ ایک دائیٰ حالت جو کہ 6 ماہ سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ پچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے جیسا کہ جگر کا کینسر یا سرروسمیں۔

## علامات:

پیپاٹائٹس سی کے متعلق عام علامات مندرجہ ذیل ہیں۔

نیند کا بہت زیادہ ہونا	☆	وزن کام ہونا	☆	جوڑوں اور پھٹوں کا درد	☆	بھوک کانہ لگنا	☆
سر درد	☆	بے چینی، خنگی	☆	نیند کام ہونا	☆	تحکاوٹ	☆
ڈھنی دباؤ	☆	ریقان	☆	پچش	☆	متلی	☆

☆ تیزی سے بدلتے ہوئے جذبات ☆ نزلے کی طرح کی علامات

## کیسے پتہ چلے گا ایک شخص اس مرض کا کیریئر ہے؟

یہ جاننے کے لئے کہ اگر آپ HCV کے کیریئر ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروانا چاہیے اور پھر آپ کو اپنے لوکل کیوٹی سروں سنتر جانا چاہیے۔ لیمارٹری میں آپ کے خون کے نمونے کا ٹیسٹ ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ آیا آپ HCV وائرس کے کیریئر ہیں یا نہیں۔ دو طرح کے ٹیسٹ درکار ہیں یہ جاننے کیلئے کہ آپ کو پیپاٹائٹس سی ہے یا نہیں۔

☆ پہلا ٹیسٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی میں پیپاٹائٹس سی کے شکار ہے تھے یا نہیں۔ پہلا ٹیسٹ یہ یقین دہانی نہیں کرو سکتا کہ آپ ابھی بھی اس مرض کا شکار ہیں یا نہیں۔

☆ دوسرا ٹیسٹ یہ جاننے کیلئے ضروری ہے کہ یہ وائرس آپ کے جسم میں کارگر ہے۔

☆ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سکرین ٹیسٹ ممکن ہے اور ایک ایسا علاج ہے جو آپ کو بجا سکتا ہے

## ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم ایک فیملی ڈاکٹرنہیں رکھتے؟

پیپاٹائٹس سی کا مفت اور رازدار نہ ٹیسٹ حاصل کرنے کے لئے آپ کا ل کر سکتے ہیں۔ 514-934-0505، ایکسٹینشن 7406

## بچھے پیپاٹاٹس سی کا ٹیسٹ کیوں کروانا چاہیے؟

بعض اوقات پیپاٹاٹس سی کی علامات سالوں تک ظاہر نہیں ہوتی اس لئے اس کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے کیونکہ جب اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تب تک جگر بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔

آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اگر اس کے مریض کے خون سے آپ کا واسطہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم آپ کو ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیں گے:

- ☆ اگر آپ میں 1987 سے پہلے خون کے لوہڑے بننے کے فیکٹریز موجود ہوں۔
- ☆ اگر آپ نے 1992 سے پہلے خون لگوایا ہو بلڈ پلازما پر وڈ کٹس یا آر گن ٹرانسپلانٹ کروایا ہو۔
- ☆ اگر آپ نے HCV کے مریض سے خون، بلازما پر وڈ کٹس یا آر گن ٹرانسپلانٹ کیلئے لیا ہو۔
- ☆ اگر آپ حادثاتی طور پر ایسے خون یا اشیاء چھو لیں جو HCV سے آلودہ ہو مثال کے طور پر آلودہ سوئی اٹھاتے ہوئے آپ کو چھو جائے۔
- ☆ آگر آپ نے مریض کی استعمال شدہ اشیاء بہت عرصہ پہلے بھی ایک بار استعمال کی ہوں مثال کے طور پر سوئی، چیچ، پانی اور شراب وغیرہ
- ☆ اگر آپ نے کسی مریض کی ایسی آلودہ اشیاء استعمال کی جو ادویات کے سوئنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ سٹرا اور بینک نوٹ
- ☆ اگر آپ نے کوئی ٹیویا چھدو انے والا کام نامناسب سٹر لا یز حالات میں کروایا ہو۔

## ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم ایک فیملی ڈاکٹر نہیں رکھتے؟

پیپاٹاٹس سی کا مفت اور رازدار انٹیسٹ حاصل کرنے کے لئے آپ کا ل کر سکتے ہیں 514-934-0505، ایکسٹینشن 7406

## تجہہ فرمائیں:

- ☆ ہپاٹاٹس سی کا ٹیکسٹ کینیڈ آنے سے پہلے میڈ یکل ٹیکسٹ میں شامل نہیں ہے۔
- ☆ اپنے ڈاکٹر سے جتنی جلدی ہو سکے مشورہ کریں۔

## کیا کوئی موثر علاج ہے؟

جی ہاں! ہپاٹاٹس سی کے علاج کے لئے ایک میڈ یکل نسخے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ایک عام ڈاکٹر اس قابل ہے کہ وہ آپ کو ایک مناسب علاج تجویز کر سکے یا حالات کے مطابق آپ کو ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس بھیج سکے۔ آج کل علاج کا دورانیہ تقریباً 12 ہفتے ہے اور یہ آج کل ماضی سے زیادہ موثر ہے۔ اگر آپ اہل ہیں تو زیادہ تر علاج RAMQ کی زیر نگرانی ہیں۔

**براحہ مہربانی** یہ یاد رکھیں کہ ہپاٹاٹس سی کے علاج کے بعد کوئی ویکسین یا مدافعت کارگر نہیں۔ اس علاج کے بعد بہت سے مریض صحت یا ب ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بھی مریض دوبارہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔

## ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم ایک فیملی ڈاکٹر نہیں رکھتے؟

ہپاٹاٹس سی کا مفت اور رازدار انٹیسٹ حاصل کرنے کے لئے آپ کا ل کر سکتے ہیں 514-934-0505، ایکسٹینشن 7406