



ACCÉSSS

Alliance des Communautés Culturelles pour
l'Égalité dans la Santé et les Services Sociaux

Respiratoire syncytial վիրուսը (RSV) – ի՞նչ պետք է իմանամ:

Respiratoire syncytial վիրուսը (RSV) տարածված վիրուս է, որը առաջացնում է շնչառական վարակներ, հատկապես նորածինների, փոքր երեխաների և տարեցների շրջանում: RSV-ն հիմնականում տարածվում է վարակված անձի հազալու կամ փռշտալու ժամանակ առաջացած շնչառական կաթիլների միջոցով: Այն կարող է նաև գոյատևել աղտոտված մակերևույթների վրա և փոխանցվել ուղղակի շփման միջոցով:

RSV-ի ախտանշանները կարող են լինել թեթևից մինչև ծանր և ներառում են քթի խցանում, հազ, շնչառության խզզոց, ջերմություն և շնչառության դժվարություն: Նորածինների և փոքր երեխաների շրջանում ախտանշանները կարող են լինել ավելի ծանր, ինչը կարող է հանգեցնել բրոնխիտի կամ թոքաբորբի: RSV-ն ավելի տարածված է աշնան, ձմռան և գարնան ամիսներին չափավոր կլիմայով շրջաններում: Հաճախակի բռնկումները կարող են տատանվել տարեցտարի:

Վաղաժամ ծնված նորածինները, վեց ամսից փոքր երեխաները, սրտի կամ թոքերի քրոնիկական հիվանդություններով տառապող երեխաները, ինչպես նաև տարեցները կամ իմունախախտ ունեցողները հատուկ ռիսկի են ենթարկվում RSV-ի ծանր բարդությունների պատճառով, ուստի կարևոր է խորհրդակցել բժշկի հետ, եթե կան ախտանշաններ և հաշվի առնել այս վիրուսի դեմ պատվաստումը, եթե դուք մտնում եք ռիսկային խմբերի մեջ: Կան հասանելի պատվաստանյութեր, որոնք պաշտպանում են տարեցներին, ինչպես նաև հղի կանանց պատվաստելու համար, որպեսզի պաշտպանեն նորածիններին:

Կարևոր է խորհրդակցել բժշկի հետ, եթե կասկածում եք RSV վարակի, հատկապես նորածինների և փոքր երեխաների շրջանում, որպեսզի ստանաք ճիշտ խորհուրդներ ախտանշանների կառավարման և բարդություններից խուսափելու վերաբերյալ: